

治療可能な認知症

疾患	気づきのポイント
薬剤の副作用	薬の内服内容のチェック
うつ病、精神的ストレス	うつ病の症状があるか。二質問票法
甲状腺機能低下症	むくみ、食欲がないのに体重が増える、皮膚の乾燥、寒がりになる、無気力など
ビタミンB ₁ 、B ₁₂ 欠乏	食事をきちんとしていない
正常圧水頭症	三主徴(歩行障害、認知症、尿失禁)
慢性硬膜下血腫	麻痺、ふらつき、意識障害など
脳腫瘍	様々な症状、無症状のこともあり
意識障害・せん妄状態	状態の時間的変動

治療可能な認知症

疾患	鑑別のための検査
薬剤の副作用	
うつ病、精神的ストレス	
甲状腺機能低下症	甲状腺ホルモン測定 (TSH, F-T3, F-T4)
ビタミンB ₁ 、B ₁₂ 欠乏	ビタミンB ₁ 、B ₁₂ 測定
正常圧水頭症	CT, MRI, タップテスト、システルノグラフィ
慢性硬膜下血腫	CT, MRI
脳腫瘍	CT, MRI
意識障害・せん妄状態	AIUEO TIPS

正常圧水頭症

脳脊髄液による脳の圧迫で
脳の機能が低下




認知機能障害

(記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下)



生活障害

(ADLの低下)




正常圧水頭症 症状

- ・ 歩行障害
歩幅が狭く、がに股
- ・ 認知機能障害
注意力の低下、思い出すことができない、細かいことができない
- ・ 尿失禁
「間に合わない」＋排尿動作がうまくできない

正常圧水頭症 チェックリスト

症状のタイプ	状態	チェック
歩行障害	小刻みに歩く、すり足で足が上がらない	<input type="checkbox"/>
	足を開き気味に歩く	<input type="checkbox"/>
	不安定で転倒することがある	<input type="checkbox"/>
認知症	物忘れ	<input type="checkbox"/>
	1日中ぼんやりしている、趣味をしない	<input type="checkbox"/>
	呼びかけに対し、反応が遅くなった	<input type="checkbox"/>
尿失禁	尿意切迫で、失禁してしまう	<input type="checkbox"/>
その他	声が小さく、表情が乏しくなった	<input type="checkbox"/>

歩行周期(walking cycle)の成り立ち




二次性水頭症・正常圧水頭症

病気

正常圧水頭症

シャント手術

髄液を脳室からお腹へ流す手術 (シャント手術) で改善する認知症



■シャント術 L-Pシャント

